



进行您的检查!

建议的癌症检查能帮助挽救您的生命。
向您的医生或护士了解这些检查。

Get your tests! – Simplified Chinese

建议的癌症筛查检查			
25 到 39 岁	40 到 49 岁	超过 50 岁	术语
<p>结直肠癌检查*</p> <p>确定您是否有患结肠癌或直肠癌的高风险。如果没有, 这时不需要检查。</p>	<p>结直肠癌检查*</p> <p>从 45 岁开始做检查。可以使用几种类型的检查。向医疗提供方了解最适合您的检查。无论选择哪种检查, 最重要的是要去做检查。</p>		<p>结直肠癌检查</p> <p>这些检查有助于预防结肠癌, 或找出更易于治疗的时机。</p>
<p>前列腺癌检查</p> <p>这时不需要检查。</p>	<p>前列腺癌检查</p> <p>从 45 岁开始, 高风险男性 (非裔美国人、有非裔血统的加勒比男性和近亲在 65 岁之前患有前列腺癌的男性) 应该与医疗提供方讨论检查的潜在风险和益处。</p>	<p>前列腺癌检查</p> <p>与医疗提供方讨论检查的潜在风险和益处, 确定检查是否适合您。如果您决定接受检查, 应该做带或不带直肠检查的前列腺特异抗原 (PSA) 血液检查。请和您的医生讨论您多久应该检查一次。</p>	<p>前列腺癌检查</p> <p>前列腺癌患者或其它病情的患者血液中的前列腺特异性抗原 (PSA) 水平可能更高。</p>
<p>乳腺癌检查*</p> <p>确定您是否有患乳腺癌的高风险。如果没有, 这时不需要检查。</p> <p>如果您发现自己乳房的外观有任何变化, 马上通知您的医生或护士。</p>	<p>乳腺癌检查*</p> <p>40-44 岁的女性可以选择每年通过乳房摄影术进行乳腺癌筛查。从 45 岁开始, 每年照乳房摄影术。</p>	<p>乳腺癌检查*</p> <p>在 45 岁到 54 岁之间, 每年照乳房 X 光片, 55 岁开始, 可以每两年照乳房 X 光片, 或只要您的身体良好, 每年继续筛查。</p>	<p>乳房摄影术</p> <p>乳房摄影术筛查是一种乳房 X 光检查, 用于帮助在没有任何乳房症状或问题的女性身上寻找乳腺癌的迹象。</p>
<p>25-65 岁有宫颈的人应该每 5 年做一次主要人类乳突病毒 (HPV) 检查。如果您不能做主要 HPV 检测, 则每 5 年做一次共检 (HPV 检测和巴氏涂片检查) 或每 3 年做一次巴氏涂片检查。接种了 HPV 疫苗的人仍然应该检查。宫颈通过手术切除的人应该停止检查, 除非手术的目的是为了治疗宫颈癌或严重的癌前病变。</p>	<p>宫颈癌检查</p>		<p>巴氏涂片检查</p> <p>巴氏涂片检查旨在检测宫颈细胞变化或有无异常细胞。</p> <p>人类乳突病毒 (HPV) 检查</p> <p>人类乳突病毒 (HPV) 检查旨在检查病毒, 可以与巴氏涂片检查同时进行。</p> <p>主要人类乳突病毒 (HPV) 检查</p> <p>以筛查为目的的人类乳突病毒 (HPV) 自行测试。</p> <p>共检</p> <p>HPV 检测和巴氏涂片检查。</p>
		<p>肺癌检查。</p> <p>如果您年龄在 55-74 岁, 身体健康且从前或现在吸烟, 每年做个低剂量 CT 扫描会对您有好处。</p>	<p>肺癌检查</p> <p>现在或过去吸烟的人患肺癌的风险更高。向医疗提供方通告您患肺癌的风险, 并进行检查。</p>

保险通常涵盖预防和筛查服务。请检查确认您的医疗保险覆盖的选项。

如果您患过任何类型的癌症, 或您的父母、兄弟姐妹或子女有过癌症, 务必向医生或护士通告这一情况。

* 如果您有特定的风险因素, 需要更早地开始检查某些癌症, 或加大检查的频率, 请向您的医生通告这一情况。

cancer.org | 1.800.227.2345

美国癌症学会公司 2018 年版权所有, 编号 080528, 2020 年 07 月修订